

| | |
|--------------------|---|
| 資 料 提 供 | |
| 平成26年1月31日 | |
| 担 当 課 (担 当 者) | 西部総合事務所福祉保健局(米子保健所) 健康支援課(<small>やながわ</small> 梁川・岩田) |
| 電 話 | 0 8 5 9 - 3 1 - 9 3 1 7 |

幼稚園における感染性胃腸炎の集団発生

1 経 緯

1月31日(金)米子市内の幼稚園から西部総合事務所福祉保健局に「多数の園児に嘔吐等の症状が発生しており、有症状者1名からノロウイルスが確認されている。」との報告があった。

2 患者発生状況(1月31日(金)午後1時現在)

| 区 分 | 在籍者数 | 累計患者数 | 現有症状者 |
|-----|------|-------|-------|
| 園 児 | 137名 | 28名 | 15名 |
| 職 員 | 18名 | 0名 | 0名 |

施 設 名：学校法人 にしき幼稚園(米子市河崎1660)

代表者名：園長 塚田 京子(つかだ きょうこ)

主な症状：嘔気、腹痛、下痢、発熱(重症者なし)

発 症 日：初発は、1月21日(火)から

(注)集団発生とは、同一施設で1週間以内に10名以上もしくは全利用者の半数以上の患者が発生した場合をいう。

患者のプライバシー保護の観点から、当該施設への取材には御配慮ください。

3 今後の対応

- (1)施設及び家庭での二次感染防止対策の徹底の指導
- (2)園児及び職員の健康調査の継続

<感染性胃腸炎(5類感染症)>

感染性胃腸炎とは、嘔気、嘔吐、腹痛、下痢などの胃腸症状を主とする感染症です。原因としては、細菌性のものとウイルス性のものがあり、ウイルス性のもののうち、ノロウイルス及びロタウイルスが代表的なものです。鳥取県感染症流行情報第4週(1月20日～1月26日)によると、東部・中部地区で流行、西部地区でやや流行の状況です。

<各施設における予防対策>

下痢、嘔吐、腹痛などの症状があった場合は、早めに医療機関を受診すること。
施設利用者等に用便後、調理前後、食事前の手洗いの励行を徹底すること。
下痢便や嘔吐物の処理をする場合は、使い捨て手袋を使用するとともに、手洗い、十分な消毒を行うこと。
手すり、ドアノブ、汚染衣服等の消毒を行うこと。
施設内で予防対策を確認し、正しい知識を普及すること。

この資料は、米子市政記者クラブにも提供しています。